وزارة الصحة

جدول التطعيمات الأساسية لدولة الكويت

(وفق القرار الوزاري رقم 46 لعام 2017م)

السن عند التطعيم	نوع الطعم	طريقة الإعطاء
الحوامل	❖ جرعتان من طعم التيتانوس عند الشهر الخامس والسابع من الحمل الأول ❖ جرعة من طعم التيتانوس عند كل حمل قادم	❖ في عضلة الكتف ❖ في عضلة الكتف
خلال ٢٤ ساعة من الولادة (حديثي الولادة)	❖ الجرعة الأولى من طعم الالتهاب الكبدي ب	❖ في عضلة الفخذ
نهاية الشهر الثاني	❖ الجرعة الأولى من طعم الشلل بالحقن (ثلاثي الفصيلة) ❖ الجرعة الأولى من الطعم الخماسي (ثلاثي بكتيري+هيموفيلس+كبدي ب) ❖ الجرعة الأولى من طعم الالتهاب الرئوي ❖ الجرعة الأولى من طعم الروتا	❖ في عضلة الفخذ ❖ في عضلة الفخذ ❖ في عضلة الفخذ ❖ بالفم
نهاية الشهر الثالث	❖ طعم الدرن (بي سي جي)	❖ داخل الجلد في الجزء العلوي الجانبي من الذراع الأيسر
نهاية الشهر الرابع	❖ الجرعة الأولى من طعم الشلل بالفم (ثنائي الفصيلة) ❖ الجرعة الثانية من الطعم الخماسي (ثلاثي بكتيري+هيموفيلس+كبدي ب) ❖ الجرعة الثانية من طعم الالتهاب الرئوي ❖ الجرعة الثانية من طعم الروتا	❖ نقطتان بالفم ❖ في عضلة الفخذ ❖ في عضلة الفخذ ❖ بالفم
نهاية الشهر السادس	❖ الجرعة الثانية من طعم الشلل بالفم (ثنائي الفصيلة) ❖ الجرعة الثالثة من الطعم الخماسي (ثلاثي بكتيري+هيموفيلس+كبدي ب) ❖ الجرعة الثالثة من طعم الالتهاب الرئوي ❖ الجرعة الثالثة من طعم الروتا	❖ نقطتان بالفم ❖ في عضلة الفخذ ❖ في عضلة الفخذ ❖ بالفم
عند استكمال السنة الأولى من العمر	❖ الجرعة الأولى من طعم الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف ❖ الجرعة الثالثة من طعم الشلل بالفم (ثنائي الفصيلة) ❖ الجرعة الأولى من طعم الجديري المائي	❖ تحت الجلد في الذراع ❖ نقطتان بالفم ❖ تحت الجلد في الذراع
عند عمر 18 شهر	❖ الجرعة الرابعة من طعم الشلل بالفم (ثنائي الفصيلة) ❖ جرعة منشطة من الطعم الخماسي ❖ جرعة منشطة من طعم الالتهاب الرئوي	❖ نقطتان بالفم ❖ في عضلة الفخذ ❖ في عضلة الفخذ
عند استكمال السنتين من العمر	❖ طعم الالتهاب السحائي رباعي الفصيلة (A, C, W135,Y) ❖ الجرعة الثانية من طعم الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف ❖ الجرعة الثانية من طعم الجديري المائي	❖ تحت الجلد في الذراع ❖ تحت الجلد في الذراع ❖ تحت الجلد في الذراع
عند استكمال ثلاث سنوات ونصف من العمر	❖ الجرعة الخامسة من طعم شلل الأطفال (ثنائي الفصيلة) ❖ جرعة منشطة من طعم الثلاثي البكتيري (دفتيريا-تيتانوس-سعال ديكي)	❖ نقطتان بالفم ❖ في العضل
من 4-6 سنوات (قبل دخول المدرسة)	التأكد من حالة الطفل التطعيمية واستكمال التطعيمات الناقصة إن وجدت	
من سن 10 -12 سنة (بالمدارس)	❖ جرعة منشطة من طعم الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف (للبنات) ❖ جرعة منشطة من طعم الثنائي البكتيري (دفتيريا - تيتانوس)	❖ تحت الجلد في الذراع ❖ في العضلة الدالية بالذراع
من سن 16 -18 سنة (بالمدارس)	❖ جرعة منشطة من طعم الثنائي (دفتيريا - تيتانوس)	❖ في العضلة الدالية بالذراع

❖ الطعم الخماسي يحتوي على : الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي والهيموفيليس انفلونزا والكبدي ب
❖ تُعطى جرعات الروتا وفقا لنوع الطعم المستخدم بواقع ٢ أو ٣ جرعات وفقا للشركة المنتجة

طبعت بدعم من جمعية صندوق إعانة المرضى